

Étiquette du patient

Ce médicament vous été prescrit
et vous pouvez le prendre selon cet
horaire proposé

Entreposage :

Veillez conserver votre SERINGUE lors de la réception :

- Au réfrigérateur
- À température de la pièce

Les seringues BD Posiflush XS sont conservées à température pièce.

SERINGUE



① BOUCHON DE LA SERINGUE

② PISTON

CATHÉTER INTRAVEINEUX



① CLAMPE

② EMBOUT DU CATHÉTER

I. Les étapes pour vous préparer avant la perfusion:

1. Sortir la seringue du réfrigérateur au moins 30 minutes ou plus avant l'administration selon les conseils de votre pharmacien. Éviter la chaleur excessive, le gel ou encore la lumière directe.
2. Assurez-vous que la seringue soit bien identifiée à votre nom et que le médicament et le dosage soient exacts. Vérifier que la date de péremption ne soit pas dépassée.
3. Lavez-vous les mains selon les instructions de votre infirmier puis rassemblez tout votre matériel dans une aire de travail propre.

II. Vous aurez besoin de :


- Seringue contenant le médicament prescrit
- Tampons d'alcool
- Seringues d'eau saline BD Posiflush XS

Comment irriguer votre cathéter avec une solution saline comme les seringues BD Posiflush XS?

Pour le rinçage de votre cathéter, référez-vous aux instructions de votre infirmier.



Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.



Déclamper la pince sur votre cathéter.



Déballer votre seringue de son emballage plastique. En maintenant la seringue pointe vers le haut, dévisser délicatement le bouchon sans découvrir la pointe de la seringue.



Pousser le piston légèrement pour libérer la bulle d'air. Dévisser complètement le bouchon de la seringue d'eau saline. Éviter de toucher l'extrémité de la seringue.



Visser la seringue à votre embout de votre cathéter. Injecter lentement la solution saline.



Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser la seringue pour la retirer.

Si vous devez suivre le rinçage de votre cathéter avec de l'héparine après la solution saline, procéder de la même façon qu'aux étapes ci-haut.

Comment brancher votre seringue contenant votre médicament ?

1



Nettoyer l'embout du cathéter avec un tampon d'alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas souffler pour assécher.

2



Déclamper la pince sur votre cathéter.

3



En maintenant la seringue pointe vers le haut, dévisser délicatement le bouchon sans découvrir la pointe de la seringue.

4



Pousser le piston légèrement pour libérer la bulle d'air si nécessaire. Retirer complètement le bouchon de la seringue. Éviter de toucher l'extrémité de la seringue.

5



Visser la seringue à votre embout de votre cathéter. Injecter lentement votre médicament selon les recommandations de votre infirmier.

6



Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser la seringue pour la retirer.

Si vous avez de la difficulté à vous administrer votre médicament, vérifier si :

-La clampette sur votre cathéter est en position ouverte.

Si vous éprouvez des difficultés pour la perfusion de votre médication ou que vous avez des questions, vous pouvez rejoindre notre pharmacien 24h/7 jours en composant le **514-526-7773 Ext #6**.

Vous pouvez également communiquer avec l'infirmier du CLSC ou composer le 811.

**PHARMACIE
TORANI ET HADDAD**


SpecPharma
TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS

**8500 Blvd Decarie Suite 100
Mont Royal, Québec, H4P 2N2
Téléphone : +1 514-526-7773 et 1844-5267771
Télécopieur : +1 514-312-9119**